

NEONATAL TRANSITIONSSTØTTE OG GENOPLIVNING NØGLEBUDSKABER



DANSK
RÅD FOR
GENOPLIVNING

GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®

Sen afnavling - mindst 60 sekunder

Længere tid kan være gavnligt
Ingen malkning af navlestreng på børn < 28 uger

Involvér forældre

Kommunikation før, under og efter fødslen
er afgørende



Tør, svøb, stimuler og hold varm

De fleste spædbørn behøver ikke avanceret
hjælp ved fødslen

Uventede fødsler uden for hospitalet kræver særlig tilgang

Ekstra fokus på forebyggelse af
hypoxæmi og hypotermi




Vurdér vejrtrækning og hjerterefrekvens

Dette vil guide den videre behandling

NEONATAL TRANSITIONSSTØTTE OG GENOPLIVNING

Meget tidligt eller ekstremt tidligt fødte børn < 32 uger kræver særlig tilgang

Plastikpose, lavere inspirationstryk, CPAP,
højere iltindhold



Åbn luftvejen og sikr, at lungerne fyldes med luft

Dette er de grundlæggende trin i
transitionsstøtte og genoplivning af nyfødte

Hjertemassage og medicin er sjældent nødvendige

Navlevenekateter er den foretrukne vaskulær adgang