


Basal genoplivning af børn og spædbørn

PBLS



Anne Lippert


Anne Lippert:

Speciallæge i anæstesi og intensiv medicin

Educator for ERCs kurser i Danmark

Medlem af styregrupperne for ALS, EPALS og
PBLS

PAEDIATRIC LIFE SUPPORT KEY MESSAGES




Forenkling

- **3 trin, der redder liv: Tjek- 112 - HLR**
- Samme alarmering som hos voksne
- Alle skal give 5 indblæsninger først
- Hvis trænet på PBLS kursus eller Sundhedsfaglig: 15:2
- Andre: 30:2

Algoritme for børn og voksne

BASAL GENOPLIVNING



Specifikt om ventilation

- 1 Børn får oftest hjertestop af iltmangel
- 2 Lær at ventilere – gerne 2 – personers teknik
- 3 Giv lige nok indblæsning til brystkassen hæver sig




Specifikt om hjertemassage

1 Hjertemassage til spædbørn: 2 – tommelfinger teknik




2 Hjertemassage til børn 1 - ca 8 år (25 kg):
Én hånd er nok



Specifikt om AED

3

AED kan bruges til alle – af alle. Brug AP position til børn 1år - 25 kg
Brug børnefunktion og pads, hvis muligt





Fremmedlegemer hos børn

0-1 (2)
år

Læg barnet langs din underarm eller på tværs over knæene.
Giv op til 5 slag i ryggen – tjek –
5 hårde tryk i brystet

Hvis bevidstløs: giv 5 indblæsninger
Hvis ingen vejrtrækning: start hjertemassage



Fremmedlegemer hos børn

>1 (2)
år

Stå eller knæl bag barnet
- gør som hos voksne

Hvis bevidstløs: giv 5 indblæsninger
Hvis ingen vejrtrækning: start hjertemassage



Spørgsmål?

