





Avanceret genoplivning Voksne



ALS

- 1 Trinvis luftvejshåndtering afhængigt af kompetence
- 2 Sikr effektive ventilationer
- 3 AED med mindre < 5 s pause til både rytmetjek og stødafgivelse
- 4 Sikr korrekt placering af laterale (apikale) pad
- 5 Mindst 150 J i første stød (BTE og RLB)
- 6 Altid støde på VF uanset amplitude


ALS

- 7 Ved SGA benyt i-gel fremfor larynxtube
- 8 Intubation kræver succesrate >95% i 2 forsøg
- 9 Tubeplacering skal verificeres med EtCO₂
- 10 Precharge er et acceptabelt alternativ ved trænede hold
- 11 IV førstevalg, IO acceptabelt alternativ efter 2 forsøg
- 12 Brug ikke calcium, bikarbonat eller steroid rutinemæssigt

AVANCERET GENOPLIVNING VOKSNE



GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®



Giv h

- Sørg for optimal placering af pads
 - Giv ilt
 - Hjertemassage uden pauser ved endotracheal tube eller supraglottisk luftvej
 - Anvend kapnografi
 - Minimér pauser i hjertemassage
 - Tidlig i.v.-adgang (i.o. hvis i.v. ikke er mulig)
- * Medicin
- Giv adrenalin efter 3. stød og derefter hvert 3.-5. minut
 - Giv amiodaron efter 3. stød



- Hypoxi
- Hypovolæmi
- Hyper-/hypokaliæmi/metabolisk
- Hypo-/hypertermi
- Toksiner
- Tamponade (kardiel)
- Trykpneumothorax
- Trombose (koronar/pulmonal)

Overvej

- Skift til antero-posterior (AP) placering af pads efter 3 stød
- Mekanisk hjertemassage for at lette transport/behandling
- Ultralydsskanning for at identificere reversible årsager
- Ekstrakorporal cirkulation og/eller koronarangiografi/perkutan koronar intervention




Umiddelbart efter ROSC

- Vurdér ABCDE
- Tilstræb SpO₂ på 94-98% og normal PaCO₂
- Tilstræb systolisk blodtryk > 100 mmHg
- 12-aflednings EKG
- Identificér og behandl årsag
- Temperaturstyring

AVANCERET GENOPLIVNING VOKSNE



GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®



AVANCERET GENOPLIVNING AF VOKSNE NØGLEBUDSKABER

Start avanceret genoplivning *tidligt*

- hvert sekund tæller!

Identificér og behandl reversible
årsager *uden forsinkelse*



Sikr *effektive* ventilationer med
hjertemassage af høj kvalitet

AVANCERET GENOPLIVNING AF VOKSNE

Giv i.v. adrenalin *tidligt* ved
hjertestop med ikke-stødbare rytmer



Defibrillér *tidligt* ved stødbare rytmer

- Brug *korrekt* antero-lateral placering af pads
- Skift til antero-posterior (AP) placering, hvis 3 stød ikke er effektive