TRAUMATISK HJERTESTOP HOS VOKSNE

DANSK RÅD FOR GENOPLIVNING

GUIDELINES 2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL©

Traumatisk hjertestop/peri-arrest

Sandsynligt ikke-traumatisk?

JA → **ALS**

NEJ

START HLR

Behandl reversible årsager simultant
Prioriter behandling af reversible årsager over hjertemassage!

- Blødningskontrol ved massiv ekstern blødning
- Skab sikker luftvej og maksimér oxygenering
- Bilateral thoraxdekompression (thorakostomier)
- **Aflast tamponade (penetrerende thoraxtraume)**
- **Proksimal blødningskontrol (manuel aortakompression)**
- Bækkenslynge
- Blodprodukter/massiv transfusionsprotokol

Hypovolæmi
Hypoxi
Trykpneumothorax
Tamponade

Ekspertise?
Udstyr?
Omgivelser?
Forløbet tid?
< 15 min.

Resuscitativ thorakotomi

Udfør **interventioner baseret på klinisk prioritet**, ikke i rækkefølge

GENOPRETTET EGENCIRKULATION?

JA

Præhospitalt:
Øjeblikkelig transport til hospital med behandlingsmuligheder

På hospital:
Akut kirurgi/stabilisering

NEJ

Overvej at indstille genoplivningsforsøg